

日本近海産貝類図鑑第2版正誤表

頁 - 図番号	解説頁 (項目)	誤	正
11 ↓ 11		臭検器	嗅検器
15 ↓ 7		Buchet	Bouchet
63-4		<i>N. pilulum</i>	<i>B. pilulum</i>
71-2		<i>M. fulgens</i>	<i>A. fulgens</i>
73-12		<i>C. opalinus</i>	<i>F. opalinus</i>
82-8		<i>lischekei</i>	<i>lischkei</i>
85-3	771 (ミナミスカシエビス)	<i>morleti</i>	<i>moreleti</i>
110-9		<i>shigemitsi</i>	<i>shigemitsui</i>
128右下 (生体)		コーヒーイロカワザン シヨウ <i>A. sp.</i>	サツマクリイロカワザン シヨウ <i>A. satumana</i>
152-8		オハグロガイの右図	フトスジムカシタモト
153-3	834 (クチベニソデガイ)	<i>haemostoma</i>	<i>haemastoma</i>
157-9		<i>cnacellata</i>	<i>cancellata</i>
159-4		チリメンクマサカ (底面)	ウスクマサカ
159-5		ウスクマサカ (底面)	チリメンクマサカ
160-3		<i>giganea</i>	<i>gigantea</i>
166-3	842 (クマドリケボリ)	<i>anuulata</i>	<i>annulata</i>
166-5	843 (シボリケボリ)	<i>incise</i>	<i>incisa</i>
172-7	847 (タツノコチヂワケボリ)	<i>pirieri</i>	<i>piriei</i>
173-7		<i>6P. gigantea</i>	<i>P. gigantea</i>
173-8		<i>Yoshioi</i>	<i>yoshioi</i>
196-8		<i>T. pluvialis</i>	" <i>T.</i> " <i>pluvialis</i>
197-9		シワオキニシ	[写真差替]
201-2		<i>inornata</i>	<i>inornata</i>
251-2		スエヒロバイ	スエヒロネジボラ
264-10	931 (クリフノシガイ)	<i>undula</i>	<i>mundula</i>
264-13	931	レンガマキノシガイ <i>mactanensis</i>	レンガヅミノシガイ <i>spica</i>
265-11	(ヒサゴホラダマシ)	<i>mergregia</i>	<i>egregia</i>
267-4		<i>opisthoplectum</i>	<i>opisoplectum</i>
268-4	934 (ラウスバイ)	<i>rausarum</i>	<i>rausicum</i>
272-1		シレトコバイ <i>R. shiretokoensis</i>	ワクイバイ <i>R. wakuii</i>

頁 - 図番号	解説頁 (項目)	誤	正
272-2		ワクイバイ <i>R. wakuii</i>	シレトコバイ <i>R. shiretokoensis</i>
272右下 (生体)		<i>ampullacea</i>	<i>ampullacea perryi</i>
273-6		キヌメセコボラ	[写真差替]
273-11	940 (アラレセコバイ)	<i>souvebii</i>	<i>souverbii</i>
296-2		<i>inonnatus</i>	<i>inornatus</i>
299-2 a (= 2右図)			クリフチヂミレイシダマシ <i>S. squamigera</i>
301-4	964 (タイワンツノオリイレ)	<i>chunfi</i>	<i>chunfui</i>
308-2		<i>carnosa</i>	sp.
314-9		<i>subscrobiculata</i>	<i>invicta</i>
318-12	979	ダンアラフデ	ダンゴマフデ
319-9		<i>interlirata</i>	<i>yagurai</i>
319-11a (= 11右図)			カラフデ <i>C. morchii</i>
325-10	987	ナメラハマズト	ナメラハマズト
326-7	988 (ファイリオリイレツクシ)	<i>monsecuorum</i>	<i>monsecourorum</i>
326-21		<i>aureolineatum</i>	<i>crocatum</i>
327-1		<i>croceum</i>	<i>renatoi</i>
327-10		<i>bilinoatum</i>	<i>bilineatum</i>
327-17		<i>thorssoni</i>	<i>terraqueum</i>
328-9		sp.	<i>yangi</i>
328-13	991 (トウダカハマズト)	<i>leucozonium</i>	<i>leucozonias</i>
328-16	992	ヨロイオトメフデ <i>V. recurvirostris</i>	ベニヨロイオトメフデ <i>V. paligerum</i>
328-20		ヌリツヤオトメフデ	ウルシヌリオトメフデ
329-9		マダラノミフデ	ゴリノミフデ
329-11		オゴクダノミフデ	オゴクダヤタテ
339-9	1003 (ツムイモ)	<i>gracatapii</i>	<i>gratacapi</i>
344-4の右図			シラボシベッコウイモ
346-4	1008 (ツゲイモ)	<i>ochroleuca</i>	<i>ochroleucus</i>
346-11	1008 (ジュズカケキジビキイモ)	<i>pseudosulcata</i>	<i>pseudosulcatus</i>
353-10	1015	オトヒメシャジク <i>G. otohimeae</i>	ヤスリオトヒメシャジク <i>G. oliverai</i>
354-1	1016	ミガキオトヒメシャジク <i>G. oliverai</i>	オトヒメシャジク <i>G. otohimeae</i>
365 (柱)		フデシャジク	フデシャジク科

頁 (項目)		誤	正
383-13	1049 (イボヒメトクサ)	<i>bathyraphe</i>	<i>bathyrhaphe</i>
384-1	フトギリ	<i>pretiosa</i>	sp.
384-4	フジタギリ	<i>fujitai</i>	<i>pretiosa</i>
385-2		ヤマモトヒタチオビ	[写真差替]
396-6		キイテラマチイトカケ	フクレタクミニナ
399-15	1065 (オオシイノミガイ)	<i>sieboldi</i>	<i>sieboldi</i>
413-5	1074 (ミツイラメリウミウシ)	<i>mitsui</i>	<i>mitsuii</i>
425-2		ガーベラミノウミウシ <i>S. gerberina</i>	サクラミノウミウシ <i>S. sakuracea</i>
432-10	1090 (ナツメガイ)	<i>B. ventricosa</i>	<i>B. vernicosa</i>
453左下 (生体)		<i>taeniata</i>	<i>taeniatum</i>
461-4		<i>yuigahama</i>	<i>yuigahamana</i>
470-4の右図 (追加)			4a タナゴジマゴクリ <i>S. sp. C</i>
513-2	1169	ヌノメアカガイ	ヌノメアカガイ
515-4	(オオシラスナガイ)	<i>belcheri</i>	<i>tokaiensis</i>
517-10	1173 (タイワンホトトギス)	<i>striatulus</i>	<i>striatulus</i>
539-8		<i>vancouverensis</i>	<i>vancouverensis</i>
559-3	(ウミアサガイ)	<i>E. delicatula</i>	<i>C. delicatula</i>
559-11	(ウツギノハナガイ)	<i>W. izuensis</i>	<i>E. izuensis</i>
565-6	1224 (イオウノシタタリ)	<i>timoriensis</i>	<i>timorensis</i>
566-1	1224	イナズマママアゲマキ	イナヅマママアゲマキ
569-7		コハギガイ	ガタヅキ
577-8	1238 (キンギョガイ)	<i>austrorjaponicum</i>	<i>australorjaponicum</i>
584-4	1244	スナカブリハマグリ	スナカムリハマグリ
594-18	1255 (ハスメザクラ)	<i>transcalpta</i>	<i>transculpta</i>
607-12		<i>constricfa</i>	<i>constricta</i>
611-6	1275	ヒズメフナクイムシ	ヒヅメフナクイムシ

頁 (項目)	誤	正
727 (アッケシケハダウミヒモ)	<i>akkeshiense</i>	<i>akkesiense</i>
729 (ヨゴレサメハダヒザラガイ: 英文↑1)	<i>Limopsis tajimae</i>	<i>Limopsis tokaiensis</i>
744	アケボノキオキナエビス	アケボノオキナエビス
755 (ヒカリシタダミ)	Dall, 1907	(Dall, 1907)
764 (ウニヒメカタベ)	<i>Bathylotia</i>	<i>Bathylotina</i>
832 (センマイドオシ: ↑1)	ハナゴウ科	ハナゴウナ科
846 (イシバシウサギ)	Kuroda, 1828	Kuroda, 1928
850 (クチムラサキダカラ: 英文↑2)	<i>Lyncia</i>	<i>Lyncina</i>
859 (ミヤタタマツメタ: ↓1)	キザミタマツメタに	ウスイロタマツメタに
913 (オカモトムシロ: 水深)	50~120 m	5~30 m
917 (クスミヨフバイ)	A. Adans, 1951	A. Adams, 1851
931 (ミダレフノシガイ)	Melville	Melvill
(クリフノシガイ)	Melvill standen	Melvill & Standen
(レンガヅミノシガイ)	<i>mactanensis</i> (Cernohorsky, 1985)	<i>spica</i> Melvill & Standen, 1895
938 (ムツフカミエゾバイ)	Faussen	Fraussen
939 (ヤマトフカミエゾバイ)	Faussen	Fraussen
(シラタマルミエゾバイ)	Faussen	Fraussen
940 (セコバイ)	<i>Coluburaria</i>	<i>Colubraria</i>
941 (チョウセンニシ: ↑1)	ヒラセツノマタモド	ヒラセツノマタモドキ
942 (シロヒメナガニシモドキ: ↑2)	足摺崎	足摺岬
959 (エゾヨウラク: 英文↓1)	<i>inortatus-complex</i>	<i>inornatus-complex</i>
962 (ウニレイシダマシの次に追加)		
	クリフチヂミレイシダマシ	Pl. 255, Fig. 2a
	<i>Semiricinula squamigera</i> (Deshayes in Belanger, 1832)	
	SL: 25 mm. 殻は両円錐形, 体層で8~9本の不明瞭な縦肋と, 縮緬状で間隔の空いた一次螺旋肋, 二次肋をもち, 一次肋は縦肋上で先端の開いた棘状に立ち上がる. 全体に灰白色で縦肋上が黒ずむ. 殻口は褐色, 外唇に小歯をもつ. 四国, 九州南部以南, 潮間帯下部岩礁.	
	Shell biconical. Surface rugose, with 8~9 indistinct axial ribs, sparse primary spiral ribs and dense secondary spiral cords. Primary ribs develop frondose spine on axial ribs. Ash-gray with dark stripe on axial ribs. Aperture brown with denticles on outer lip. Shikoku, southern Kyushu and southwards, intertidal rocky bottom.	
967 (テラマチカセン: ↓1)	ヒジリノカンムリ	ヒジリノカムリ
967 (ナカヤスカセン: 英文↑1)	Norfolk	Norfolk Ridge

頁 (項目)	誤	正
969 (ニクイロサンゴヤドリ)	<i>carcosa</i> Kosuge, 1986	sp.
971 (コウモリサンゴヤドリ : 水深)	100~300 m	10~50 m
975 (クロチュウカフデ ↓4)	ヤナギシボリフデ	削除
975 (センマイドオシフデ)	<i>subscrobiculata</i> d'Orbigny, 1852	<i>invicta</i> Huang & Salisbury, 2017
981 (アヤカラフデの次に追加)		
	カラフデ	Pl.275, Fig. 11a
	<i>Cancilla morchii</i> (A. Adams, 1855)	
	SL : 70 mm. アヤカラフデに似るがやや小ぶりで、肩の膨らみは弱く、螺肋間は明瞭でやや広い。房総半島以南、東シナ海、南シナ海、水深30~400 m.	
	Resembling <i>C. isabella</i> , but smaller, with weakly humped shoulder, impressed and broader interstices. Boso Peninsula and southwards to the East and South China Seas, 30-400 m depth.	
989 (チャスジツクシ)	<i>aureolineatum</i> Turner, 1988	<i>unifasciale</i> (Lamarck, 1881)
989 (オレンジオトメフデ)	<i>croceum</i> (Reeve, 1845)	<i>renatoi</i> Poppe, Tagaro & Salisbury, 2009
(同上 ↓5-6)	<i>V. renatoi</i> Poppe, Tagaro & Salisbury, 2009はおそらく本種の異名,	削除
989 (ホソミヨリオトメ : 英文 ↓1, 3)	<i>unifasxiale</i>	<i>unifasciale</i>
990 (ソメワケオトメフデ : ↓5 / 英文 ↓6)	<i>satumae</i>	<i>satsumae</i>
990 (トリカゴオトメフデ)	<i>thossoni</i> Poppe, Suduiraut & Tagoro, 2006	<i>terraqueum</i> Huang, 2017
991 (コツブオトメフデ)	sp.	<i>yangi</i> Huang, 2017
992	ヨロイオトメフデ <i>Vexillum (Pusia) recurvirostris</i> (G.B.Sowerby III, 1908)	ベニヨロイオトメフデ <i>Vexillum (Pusia) paligerum</i> Sowerby II & Sowerby III, 1874
993 (トウガタフデガイ)	Puillander	Puillandre
1000 (ランヨモスガライモ ↑2 / 英文 ↑3)	東シナ海西部 Western East China Sea	東シナ海南西部 southwestern East China Sea
1001 (キシウイモ : 英文 ↑1)	southwestern Africa	southeastern Africa
1003 (ダイヤイモ : 英文 ↓1)	<i>gracatapii</i>	<i>gratacapi</i>
1015 (トウガタコシボソクチキレツブ ↓3~4)	紀伊半島、九州西岸以南、熱帯インド - 西太平洋、潮下帯の砂礫底.	削除
1016 (ハナヤカフデシャジク)	<i>giliberti</i>	<i>giliberti</i>
1018 (カガリビフタナシシャジク / ヨコツナシズクニナ)	Stahlschmit	Stahlschmidt
1050 (ジェニンギギリ~キリガイ)	<i>Cinguloterabra</i>	<i>Cinguloterebra</i>

頁 (項目)	誤	正
1050 (フトギリ)	<i>pretiosa</i> (Reeve, 1842)	sp.
1050 (フジタギリ)	<i>fujitai</i> (Okutani & Habe, 1975)	<i>pretiosa</i> (Reeve, 1842)
1065 (オオシノミガイ／ムラクモキジビキガイ)	<i>Japanacteon</i>	<i>Japonacteon</i>
1068 (ヤマトシンカイウミウシ：和文↓4)	新海	深海
1075 (シロイバラウミウシ：英文↓4)	Inlan	Inland
1083	ガーベラミノウミウシ <i>Sakuraeolis gerberina</i> (Hirano, 1999)	サクラミノウミウシ <i>Sakuraeolis sakuracea</i> Hirano, 1999
1093 (エチゴウミコチョウ)	Hamatani, 2008	Hamatani, 2009
1101 (ヒラカラマツガイ：和文↑2) (ヒラカラマツガイ：英文↑1)	<i>S. laciniosa</i> (Linnaeus, 1758) とされることもある。 Sometimes treated as <i>S. laciniosa</i> (Linnaeus, 1758)	本種に <i>S. laciniosa</i> (Linnaeus, 1758) の名が用いられていることもある。 Some authors applied the name <i>S. laciniosa</i> (Linnaeus, 1758) to this species.
1106 (ケショウクリムシクチキレ：英文↓1)	<i>taeniata</i>	<i>taeniatum</i>
1115 (ヒネモスクチキレ：↑3／英文↓4)	<i>rubura</i>	<i>rubra</i>
1116 (オトヒメクチキレモドキ：英文↓1)	<i>sagamiana</i>	<i>jucundior</i>
1119 (クチキレモドキ：↓3／英文↓3)	北海道南部 Southern Hokkaido	北海道南部～九州 Southern Hokkaido, southward to Kyushu
1119 (アサギリクチキレモドキ：英文↓1)	<i>desimana</i>	<i>planata</i>
1123 (イソチドリ：英文↑1)	<i>Atrina pectinata</i>	<i>Atrina japonica</i>
1123 (マキモノガイ：英文↑2)	<i>Pinna bicolor</i>	<i>Pinna attenuata</i>
1123 (シロヒメゴウナ：英文↑2)	<i>Pinna bicolor</i>	<i>Pinna attenuata</i>
1126 (ヒエンハマゴクリの解説に追記)	<p>右写真はヒエンハマゴクリに似るが体壁が薄いので徳島県阿南市伊島の属島棚子島のみから知られる別種タナゴジマゴクリ <i>Smeagol</i> sp. C とする。</p> <p>Right image is <i>Smeagol</i> sp. C, similar to sp. B, but body wall thin, known only from Tanagojima Islet near Ishima Island, Anan, Tokushima Prefecture.</p>	
1171 (オオシラスナガイ)	<i>belcheri</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	<i>tokaiensis</i> Yokoyama, 1910
1173 (アラヒメイガイ)	SL：83 mm	SL：8.3 mm
1208 (クビタテツツガキ：↑2)	石炭	石灰
1209 (サンゴツツガキ：↓3)	背殻	背縁
1209 (ヨリメツツガキ：↓1)	全種	ナガハマツツガキ
1217 (ウミアサガイ)	<i>Epicodakia</i>	<i>Ctena</i>

頁 (項目)	誤	正
1218 (ウツギノハナガイ)	<i>Wallucina</i>	<i>Epicodakia</i>
1230 (種名及び↑1~2)	コハギガイ “ガタヅキ” と呼ばれる のは本種.	ガタヅキ 別称コハギガイ.
1232 (ゲイコツケシハマグリ：↑2／英文↑1)	野間崎沖 Nomasaki	鹿児島県野間岬沖 Noma-misaki
1238 (キンギョガイ)	Ter Poorton	ter Poorton.
1239 (ツツレザル：↑1)	加計呂間島	加計呂麻島
1243 (アラスジケマンガイ)	[Röding, 1798]	(Röding, 1798)
1261 (ホソアシガイ：英文↓3)	Boso Peninula	Boso Peninsula
1267 (ハコベノハナガイ)	SL：40 mm	SL：4 mm
1270 (ニオガイ科：英文↓5)	present on both right	present on right
1270 (カモメガイ：英文↑2)	into dead shells in	into shells of such as <i>Haliotis</i> (a dwarf form: b) in
1271 (ウミタケ：英文↑2)	sputwards	southwards
1275 (シャモジフナクイムシ：英文↓2)	ladle-like	paddle-like
1275 (カタビラフナクイムシ：↓3)	ヒズメフナクイムシ	ヒヅメフナクイムシ



197.9
シワオキニシ



273.6
キヌメセコボラ



385.2
ヤマモトヒタチオビ